Energiepflanzenanbau und Biodiversität

Landwirte ackern zur Förderung der
Biodiversität im Münsterland

14.03.2019 – Fachforum
„Lebendige Agrarlandschaften“ –
Zwischenbilanz und Perspektiven

Christiane Baum
Stiftung Westfälische Kulturlandschaft
Schorlemerstraße 11
48143 Münster

Ziele & Projektgebiet

Ziele: Sicherung und Förderung von Ökosystemleistungen

- Erhalt und Förderung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen
- Förderung des Anbaus nachwachsender Rohstoffe im Einklang mit der Biodiversität
- Aufwertung des Landschaftsbildes
- Ressourcenschutz: Erosionsschutz, Gewässerschutz, Bodenschutz

Maßnahmen

Maßnahmenumsetzung

Umgesetzte Maßnahmen 2015 - 2018

Stand: 31.12.2018

Kombinierte Maßnahmen

Extensives Getreide

Einjähriger Blühstreifen

Extensives Getreide

Ergebnisse der Begleituntersuchungen

Schwebfliegen, Wildbienen und Wespen: Gelbschalenfänge

Erfassung aller vorkommenden Arten und Individuen mittels Gelbschalen

Schwebfliegen, Wildbienen und Wespen: Gelbschalenfänge

Durchschnittliche Arten- (links) und Individuenzahlen (Individuenzahlen) der nachgewiesenen Schwebfliegen, Wildbienen und Wespen kumuliert über sechs Fangperioden auf den Projekt- und Referenzflächen.

Tagfalter - Transektbegehung

Abk.: EBB: Einjährige Biogas-Blümmischung; MnB: Mehrjährige niederwüchsige Blümmischung; SMG: Stangenbohnen-Mais-Gemenge; SGG: Sommergetreidegemenge

Durchschnittliche Arten- und Individuenzahlen der nachgewiesenen Tagfalter auf den Maßnahmen- und Referenzflächen kumuliert über drei Transektbegehungen.

Avifauna – Brutrevierkartierung

nach SÜDBECK et al. (2005) inkl. rastender oder durchziehender Vogelarten auf 10 ha

Durchschnittliche Anzahl relevanter Vogelarten in ein- und überjährigen sowie mehrjährigen und kombinierten Maßnahmen, im Vergleich zu konventionellen Getreide - und Maisflächen als Referenz.

Avifauna – Brutrevierkartierung

Durchschnittliche Anzahl relevanter Vogelarten in mehrjährigen Maßnahmen in Abhängigkeit von der Flächengröße.

Strip Till

Strip Till mit bearbeitungsfreier Schonzeit

Gülle-Strip Till
Bearbeitungsfreie
Schonzeit
Maisausaat

Avifauna - Brutrevierkartierung

Avifauna - Brutrevierkartierung

Avifauna – Winterkartierung

Kartierung von Wintergästen auf 10 ha in mehrjährigen und überjährigen Maßnahmen

Avifauna – Winterkartierung

Avifauna – Winterkartierung

Durchschnittliche Individuen- und Artenzahlen nachgewiesener Rastvögel und Wintergäste auf Maßnahmen- und Referenzflächen kumuliert über zwei Kartierdurchgänge

Stangenbohnen-Mais-Gemenge

© Dr. W. Schmidt

© Dr. W. Schmidt

Stangenbohnen-Mais-Gemenge

- mehr Biodiversität
- höherer Rohproteingehalt
- höherer Energiegehalt

Stangenbohnen-Mais-Gemenge

2018/07/13
15:40:43

Ergebnisse der Gärversuche (Batch-Test)

Verlauf der Gasbildung von Stangenbohnen-Mais-Gemenge (links) über den Versuchszeitraum von 35 Tagen bei $36\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$ im Vergleich zur durchschnittlichen Gasausbeute für Maissilage nach KTBL.

Danke

©Dr. W. Schmidt

© Dr. B. Stemmer

©Dr. B. Stemmer

Stiftung Westfälische Kulturlandschaft
Schorlemerstraße 11
D48143 Münster

Christiane Baum
baum@kulturlandschaft.nrw
Tel.: 0251/4175-181
www.kulturlandschaft.nrw

Ausgezeichnetes Projekt
UN-Dekade Biologische Vielfalt
2017

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**